

ENGLISH (en)

Indications for use:

The VariSoft™ infusion set is indicated for the subcutaneous infusion of insulin administered by an external pump. The infusion set is indicated for single use.

INTENDED USE

The infusion set is indicated for subcutaneous infusion of insulin in the treatment of diabetes. The infusion set has been tested to be compatible with insulin approved for subcutaneous infusion.

PRODUCT DESCRIPTION

VariSoft™ is an infusion set with an insertion angle between 20-45°. The VariSoft™ cannula and tubing make up the infusion set. The product is delivered sterile and ready for use.

CONTRAINDICATIONS

VariSoft™ is neither intended nor indicated for use with blood or blood products (IV infusion).

WARNINGS

- ☐ Carefully examine the instructions for use before inserting VariSoft™. Failure to follow instructions may result in pain or injury.
- ☐ VariSoft™ infusion sets with Lock™ tubing connectors should only be used with Tandem cartridges featuring the Lock™ connector.
- ☐ The VariSoft™ infusion set is only sterile and non-pyrogenic if the packaging is undamaged and unopened. Do not use if the packaging is already opened or is damaged.
- ☐ When using VariSoft™ for the first time, do so in the presence of medical personnel.
- ☐ Inaccurate medication delivery, site irritation or infection may result from improper insertion and maintenance of infusion site.
- ☐ Do not re-insert the introducer needle into the infusion set. This could cause a tearing or damage of the soft cannula and may lead to unpredictable medication flow.
- ☐ Reuse of the infusion set may cause site irritation or infection and may increase the risk of infection.
- ☐ Do not use the infusion set if the packaging is damaged or if you are unsure that the needle guard is removed before insertion is made.

- ☐ Never try to fill or force a clogged tubing while the infusion set is inserted. This may result in unpredictable medication flow.
- ☐ Do not leave air in the infusion set. Make sure that the full tubing length is inserted using careful care as the cannula could be placed in underlying muscle or dermal layer which may lead to unpredictable medication delivery. Normal insertion angle between 20-45°. Consult your healthcare provider concerning this matter.
- ☐ Check the infusion set frequently to ensure that the soft cannula remains firmly in place. Replace with a new infusion set at a new site, if the infusion set is not in place. Since the cannula is soft, it will not cause any pain if it slips out, but it may be inserted without notice. The soft cannula must always be completely inserted to receive the full amount of medication.
- ☐ Do not use any pH disinfectants, perfumes, deodorants or other products containing disinfectants in contact with the connector or the tubing. This may affect the integrity of the infusion set.
- ☐ Replace the infusion set if the adhesive tape becomes loose.
- ☐ Replace the infusion set every two to three hours, or per your healthcare provider's instructions.
- ☐ If the infusion site becomes irritated or infected, replace the infusion set and use a new site until the first site has healed.
- ☐ Use aseptic techniques when temporarily disconnecting VariSoft™. Consult with healthcare provider on how to compensate for missed medication when disconnected.
- ☐ People with small or large amounts of subcutaneous fat should be inserted with insertion angle carefully, as the cannula could be placed in underlying muscle or dermal layer which may lead to unpredictable medication delivery. Normal insertion angle between 20-45°. Consult your healthcare provider concerning this matter.

- ☐ Replace the infusion set if the adhesive tape becomes loose.
- ☐ Replace the infusion set every two to three hours, or per your healthcare provider's instructions.
- ☐ If the infusion site becomes irritated or infected, replace the infusion set and use a new site until the first site has healed.
- ☐ Use aseptic techniques when temporarily disconnecting VariSoft™. Consult with healthcare provider on how to compensate for missed medication when disconnected.
- ☐ People with small or large amounts of subcutaneous fat should be inserted with insertion angle carefully, as the cannula could be placed in underlying muscle or dermal layer which may lead to unpredictable medication delivery. Normal insertion angle between 20-45°. Consult your healthcare provider concerning this matter.

- ☐ Check your blood glucose level one to three hours after insertion of the VariSoft™. Measure your blood glucose on a regular basis. Discuss this with your healthcare provider.
- ☐ Do not change infusion set just prior to bedtime, unless instructed. Do not change the infusion set more than three hours after insertion.
- ☐ If your blood glucose level becomes unexpectedly high, or occlusion alarm occurs, check for clogs and leaks. If it doesn't, change the infusion set since soft cannula could be dislodged, clogged or partially dislodged. Discuss plan to bring down your blood glucose level with your healthcare provider should any of these problems arise. Test blood glucose level to make sure problem is corrected.
- ☐ Carefully monitor your blood glucose when disconnected and after reconnecting.

- ☐ If you are not using this device or as a result of its use a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

- ☐ Store infusion sets in a cool, dry location at room temperature. Do not store infusion sets in direct sunlight, or in high humidity.
- ☐ Store and handle insulin according to the manufacturer's instructions.
- ☐ Dispose of the introduced needle in a proper sharps container according to local laws, to avoid risk of needle stick.
- ☐ Dispose of a used infusion set according to local regulations for biohazardous waste.

- ☐ Store infusion sets in a cool, dry location at room temperature. Do not store infusion sets in direct sunlight, or in high humidity.
- ☐ Store and handle insulin according to the manufacturer's instructions.
- ☐ Dispose of the introduced needle in a proper sharps container according to local laws, to avoid risk of needle stick.
- ☐ Dispose of a used infusion set according to local regulations for biohazardous waste.

- ☐ Store infusion sets in a cool, dry location at room temperature. Do not store infusion sets in direct sunlight, or in high humidity.
- ☐ Store and handle insulin according to the manufacturer's instructions.
- ☐ Dispose of the introduced needle in a proper sharps container according to local laws, to avoid risk of needle stick.
- ☐ Dispose of a used infusion set according to local regulations for biohazardous waste.

- ☐ Store infusion sets in a cool, dry location at room temperature. Do not store infusion sets in direct sunlight, or in high humidity.
- ☐ Store and handle insulin according to the manufacturer's instructions.
- ☐ Dispose of the introduced needle in a proper sharps container according to local laws, to avoid risk of needle stick.
- ☐ Dispose of a used infusion set according to local regulations for biohazardous waste.

- ☐ Store infusion sets in a cool, dry location at room temperature. Do not store infusion sets in direct sunlight, or in high humidity.
- ☐ Store and handle insulin according to the manufacturer's instructions.
- ☐ Dispose of the introduced needle in a proper sharps container according to local laws, to avoid risk of needle stick.
- ☐ Dispose of a used infusion set according to local regulations for biohazardous waste.

ESPAÑOL (es)

Indicaciones de uso:

El equipo de infusión VariSoft™ está indicado para la infusión subcutánea de insulina administrada a través de una bomba externa. El equipo de infusión es de un solo uso.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes. El equipo de infusión se ha probado para que sea compatible con las insulinas autorizadas para infusión subcutánea.

die nicht erfolgte Medikamentenabgabe ausgleichen können, wenn Sie das Infusionsset trennen.

Patenes nie aveva vide UltraEffettive meissen den Einfuhrkeil mit Sorgfalt auswhlen, um die Kanule nicht in der darunterliegenden Muskulatur- oder Hautschicht zu platzieren, wodurch eine nicht vorhersehbare Medikamentenabgabe verursacht werden konnte. Der standardmfilige Einfuhrkeil liegt zwischen 20° und 45°. Besprechen Sie dies mit Ihrem Arzt.

Para eliminar la aguja introducida, utilice un contenedor de equipo punturado conforme a la normativa local. Para evitar el riesgo de pinchazo con la aguja.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Para eliminar la aguja introducida, utilice un contenedor de equipo punturado conforme a la normativa local. Para evitar el riesgo de pinchazo con la aguja.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

Desecha el equipo de infusión usado según la normativa local para desechos biológicos peligrosos.

VOORZORGSMAATREGELEN

Probeer een steriel slangetje netjes net vullen of vrij te maken terwijl de infusie is ingedrukt. De toediening van de medicatie is hierdoor mogelijk niet meer betrouwbaar.

Zorg dat er geen lucht in de infusielijn blijft zitten. Zorg ervoor dat de slang volledig is gevuld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de pompfabrikant.

VariSoft™ is bedoeld voor eenmalig gebruik en moet na gebruik worden weggegoed. Probeer de infusielijn niet te reinigen of opnieuw te steriliseren.

Controleer de infusielijn regelmatig om na te gaan of de zachte canule nog op zijn plek zit. Vervang door een nieuwe infusielijn indien op een andere inbrengplaats, als de infusielijn niet op zijn plaats zit. Omdat de canule zacht is, ontstaan geen pijnklachten als deze eruit gaat. Dit kan dan ook niet worden gemerkt. De zachte canule moet altijd volledig zijn ingebracht om de volledige hoeveelheid medicatie te kunnen toedienen.

Voorook dat de connector van slang in aansluiting komen met desinfectiemiddel, parfum, deodorant, cosmetica of andere producten die desinfectiemiddelen bevatten. Deze producten kunnen de werking van de infusielijn negatief beïnvloeden.

Vervang de infusielijn indien twee tot drie dagen, of zo vaak als uw zorgverlener u adviseert.

Vanaf het begin van de infusie tot twee tot drie dagen, of zo vaak als uw zorgverlener u adviseert.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

Als u merkt dat de infusielijn niet goed werkt, stop de infusie op en raadpleeg uw arts.

VariSoft™

Instructions for Use

Instrucciones de uso / Mode d'emploi / Anwendungshinweise / Istruzioni per l'uso / Gebrauchsanweisung / Брусанвннж / Használati útmutató / Käyttöohje / 取扱説明書 / Bruksanvisning / Инструкция / Брусанвннж / Инструкци по применению / Návod k použití

TANDEM DIABETES CARE

© 2019 Tandem Diabetes Care, Inc. All rights reserved. Tandem Diabetes Care, VariSoft and Lock are either registered trademarks or trademarks of Tandem Diabetes Care, Inc. in the United States and/or other countries. AW-100K228_E

© 2019 Tandem Diabetes Care, Inc. All rights reserved. Tandem Diabetes

